

Indicații și contraindicații

Contraindicația reprezintă situația în care ar putea crește riscul pentru o reacție adversă gravă, ar putea cauza confuzie în diagnostic sau ar putea compromite capacitatea vaccinului de a produce imunitate.

Contraindicații absolute pentru vaccinare:

- Istoric de reacție alergică severă la substanțele active sau la oricare dintre excipienții vaccinului
- Istoric de reacție alergică severă după administrarea de vaccin papilomavirus uman

Contraindicații temporare pentru vaccinare:

- Nu se administrează pe perioada sarcinii
- Boli acute febrile
- Boli acute forme moderate sau severe cu sau fără febră
- Boli cronice decompensate
- Dacă ați primit transfuzii de sânge/produse din sânge sau s-a administrat imunoglobulină în ultimele 3 luni

Schemă de vaccinare

De la 1 octombrie 2025, vaccinul *Papilomavirus uman 9-valent* (denumire comercială Gardasil 9) este gratuit pentru fete și băieți, cu vârsta între 11 și 26 ani, și **compensat 50% pentru femeile cu vârsta între 27 și 45 de ani**. Se recomandă ca prima administrare a vaccinului să se realizeze până la vârsta de 14 ani.

Persoane cu vârsta de 11 până la 14 ani inclusiv, la momentul primei injectări:

Gardasil 9 poate fi administrat conform unei scheme cu **2 doze (0, 6 – 12 luni)**. A doua doză trebuie administrată într-un interval de 5 până la 13 luni după prima doză. Dacă a doua doză de vaccin este administrată mai devreme de 5 luni după prima doză, trebuie administrată întotdeauna o a treia doză.

Persoane cu vârsta de 15 ani și peste, la momentul primei injectări:

Gardasil 9 trebuie administrat conform unei scheme cu **3 doze (0, 2, 6 luni)**.

A doua doză trebuie administrată la cel puțin o lună după prima doză și cea de-a treia doză trebuie administrată la cel puțin 3 luni după cea de-a doua doză. Toate cele trei doze trebuie administrate în decursul unei perioade de 1 an.

Mod de administrare: vaccinul trebuie administrat prin **injectare intramusculară**. Locul de injectare preferat este în regiunea deltoidă a brațului sau în regiunea antero-laterală superioară a coapsei. După discuția cu medicul vaccinator și efectuarea vaccinării, veți fi supravegheat medical timp de 15 minute.